

XXVII

Jornadas Chilenas de Salud Pública

• Tuberculosis en la Región de Atacama durante los años 2005-2007

Esteffan S., Karim (1); Wolff L., Claudia (1); Ageno B., Yannina(2)

Introducción

En Chile, durante las últimas décadas la tasa tuberculosis ha logrado un descenso mantenido, alcanzando en el año 2000 el umbral de inicio de eliminación de la enfermedad, es decir, una tasa de 20 por 100000 habitantes. Sin embargo la situación epidemiológica de esta patología presenta grandes diferencias tanto entre regiones, como al interior de éstas.

El Ministerio de Salud ha estratificado las regiones de nuestro país según su grado de progresión hacia la eliminación de la enfermedad. Si bien, más del 84% de la población vive en áreas que han alcanzado la fase de eliminación de la tuberculosis o están próximas a hacerlo, la región de Atacama se localiza en el grupo III, es decir, entre las que se encuentran lejos de la fase de eliminación, por lo que esta enfermedad constituye un importante problema de Salud Pública en esta región.

Objetivos

Realizar una descripción epidemiológica de los casos de tuberculosis diagnosticados durante los años 2005-2007 en la región de Atacama.

Metodología

Diseño: Estudio descriptivo

Recolección de datos: se analizaron los registros de notificaciones de casos de tuberculosis del Servicio de Salud Atacama durante los años 2005-2007. Fueron incluidos todos los pacientes con diagnóstico de tuberculosis notificados en el Servicio durante los años 2005-2007. No hubo criterios de exclusión. Las principales variables consideradas fueron sexo, edad, año y lugar de diagnóstico.

Resultados

Fueron incluidos en el estudio 167 pacientes, de los cuales 115 (68.86%) fueron de sexo masculino y 52 (31.14%) de sexo femenino. El promedio y la mediana de edad fueron de 52 años, con rango entre 2 y 92 años.

Del total de notificaciones realizadas, 43 (25.75%) correspondieron al 2005, 78 (46.71%) al 2006 y 46 (27.54%) al 2007.


Con respecto al lugar de diagnóstico de los casos, 117 (70.06%) fueron a nivel hospitalario, mientras que 49 (29.34%) se realizaron a nivel de consultorios de atención primaria y 1 caso (0.6%) a nivel del extrasistema de salud.

Conclusiones

Este estudio permite conocer algunas características de la tuberculosis en la región de Atacama, tanto de los casos diagnosticados como de la pesquisa de estos. Sus limitaciones son el corto período de tiempo estudiado y los posibles errores en el proceso de notificación y almacenamiento de la información en la base de datos.

En el período estudiado se observan grandes diferencias en el número de casos diagnosticados entre el año 2005 y 2007 con respecto al 2006, donde el número de notificaciones fue casi el doble de los otros dos años, pudiendo esto corresponder a un aumento de casos o una mejor pesquisa desarrollada durante dicho año.

Cabe destacar el hecho de que la mayoría de los diagnósticos en esta región se está realizando a nivel hospitalario y no a nivel primario, siendo la proporción de diagnósticos realizados en atención primaria inferior a lo encontrado en registros similares realizados a nivel nacional.



XXVII

Jornadas Chilenas de Salud Pública

De acuerdo a lo anteriormente expuesto podemos concluir se necesita realizar un diagnóstico global de la situación de la tuberculosis en la región para así generar un plan estratégico que permita mejorar la pesquisa, principalmente a nivel primario y así lograr llegar a la fase de erradicación de enfermedad en nuestra región.

Palabras Clave

Tuberculosis, pesquisa, fase de eliminación.

- (1) Escuela de Salud Pública, Facultad de Medicina, Universidad de Chile.
karimesteffan@hotmail.com
- (2) Consultorio San José de Chuchunco, Servicio de Salud Metropolitano Central.



XXVII

Jornadas Chilenas de Salud Pública



Universidad de Chile
Facultad de Medicina
Escuela de Salud Pública

Palabras Clave

Cáncer gástrico, gastrectomía, salud pública.

(1) Alumno de la Escuela de Medicina, Facultad de Medicina, Universidad de Chile. ahaziel@gmail.com

