

XXVII

Jornadas Chilenas de Salud Pública

• Causas más frecuentes que provocan extracción dental en pacientes mayores de 15 años

Muza C., Ricardo (1); Silva G., Juan (2)

Introducción

La urgencia odontológica es la aparición súbita de una condición patológica buco maxilo facial, principalmente motivada por dolor, cuyo tratamiento debe ser inmediato, impostergable, oportuno y eficiente.

La odontología apunta a estimular y priorizar la prevención, tratamientos restauradores y curativos. No obstante ello, debido a la falta de conocimiento de la población en general, limitado acceso a la atención dental, falta de horas dentista en el Servicio Público, disponibilidad de tiempo de los pacientes, y agravado por problemas socioeconómicos; existe una gran demanda de la población por atenciones dentales, que acuden a los Servicios de Urgencia dental en busca de una solución. Las patologías orales más prevalentes en nuestro país son la caries dental y las enfermedades periodontales. Estas patologías tienen una alta prevalencia, alrededor del 90% de la población sufre de caries, y casi un 100% de los pacientes mayores de 20 años tienen lesiones inflamatorias y traumáticas del periodoncio.

El Servicio de Urgencia de la Posta Central no solo atiende a las personas asignadas al Servicio Metropolitano Central; sino a todos los pacientes que acuden a ella, independientemente de donde provengan.

Esta situación descrita nos motivó a realizar este estudio para determinar las causas más frecuentes que provocan la extracción dentaria, en la Posta Central, Hospital de Urgencia Asistencial Pública.

Objetivos

Evaluar las causas más frecuentes que provocan las extracciones en pacientes mayores de 15 años, realizadas en la Posta Central

Metodología

Se realizó un estudio descriptivo de las extracciones realizadas en el Servicio de Urgencia dental de la Posta Central, durante Mayo y Junio 2008, en un turno de 32 horas semanales, en pacientes mayores de 15 años, de ambos sexos. El registro fue realizado por un solo dentista A.P.

Se consideraron variables de sexo, edad, y otras. Causas de extracción se consideraron: caries y sus complicaciones, periodontales, traumáticas, retenidos, otros. Criterios de exclusión: se excluyeron de la muestra los pacientes menores de 15 años, y los pacientes con enfermedades generales cuya intervención quirúrgica significaba un riesgo mayor para su persona. Criterio de inclusión: fueron considerados todos los pacientes mayores de 15 años que les fue realizada alguna extracción durante el periodo en estudio, durante los turnos aludidos

Resultados

En el periodo en estudio se realizaron 1336 extracciones. 49.2% en mujeres y 50.8% en hombres. Causa de caries y complicaciones 1032 (77.2%), por enfermedad periodontal 149 (11.2%), por traumatismo 24 (1.8%), por piezas retenidas 112 (8.4%), por otros 19 (1.4%). La edad media de los pacientes de la muestra fue 42.3 años. El grupo etéreo de 21 a 64 años fue el más numeroso con 1035 extracciones (77.5%)

Conclusiones

Las caries y sus consecuencias fueron la causa etiológica principal de las extracciones realizadas en los pacientes de este estudio, seguido por las causas periodontales en una menor proporción. El grupo de 20 a 64 años es el que más acude a este servicio de urgencia dental demandando atención.

Para reducir el porcentaje de extracciones realizadas de esta población, se deben focalizar los esfuerzos en la educación, prevención y tratamiento oportuno

Palabras Clave

Caries dentales, extracción dental, urgencia dental

(1) Jefe Servicio dental Especialidades, Hospital San Borja Arriarán

(2) Dentista 28 horas A.P. Posta Central, HUAP