

# XXXVII

# Jornadas Chilenas de Salud Pública

## • Descripción del dolor de los pacientes con cáncer avanzado atendidos en los hospitales Carlos van Buren y Eduardo Pereira, enero 2003 a diciembre 2004.

Martínez T., Andrea (1); Gregoire., Jorge (2)

### Introducción

El paulatino envejecimiento que ha experimentado la población chilena ha modificado el perfil epidemiológico, adquiriendo una creciente importancia las enfermedades crónicas no transmisibles, lo cual ha dado relevancia al programa de alivio del dolor, que se debe al creciente aumento de la esperanza de vida de los chilenos consecuente con, el aumento de las tasas de morbi-mortalidad por tumores malignos. En Chile las tasas de mortalidad por esta causa aumentaron su frecuencia de 108.1 por cien mil habitantes en 1990 a 123.7 en el 2004. El 55% de las personas con diagnóstico cáncer actualmente requerirán atenciones de este programa.

### Objetivos

Conocer las características epidemiológicas y la variación de la intensidad del dolor de los pacientes del programa de alivio del dolor por cáncer avanzado del Servicio de salud Valparaíso – San Antonio.

### Metodología

Es un estudio de cohortes histórico de 400 pacientes del Programa de alivio del dolor, controlados en los policlínicos de los hospitales Carlos van Buren y Eduardo Pereira de Valparaíso entre enero 2003 y diciembre del 2004. Se buscó la información en los tarjetones de control, hojas de ingreso y egreso de los pacientes del programa. Con la información disponible, se confeccionó una base de datos con todas las variables a estudiar, las cuales se analizaron con el programa estadístico G-Stat.

### Resultados

la mayoría de los pacientes se encuentran entre 45 a 64 años, el cáncer más frecuente fue el gástrico (14.75%), los EVA más bajos se encontraron en etapa I (71,42%) y en etapa II (66.6%), el 33% permaneció entre 0-30 días y el 6.75% superó el año, el 62% de la población estudiada en tratamiento analgésico percibió una disminución del dolor, el 14.25% percibió aumento en su EVA y el 17.75% no experimentó cambio en su nivel del dolor.

### Conclusiones

El perfil epidemiológico es similar al de países en desarrollados, y los valores de EVA muestran un porcentaje de pacientes el dolor no se controló.

### Palabras Clave

Dolor, Cuidados paliativos, cáncer terminal.

(1) Kinesióloga; Magíster Salud Pública mención Atención Primaria; Kinesióloga Asociación Chilena de Seguridad; Profesora ayudante carrera Kinesiología, Universidad de Valparaíso

(2) Odontólogo; Magíster Salud Pública mención Epidemiología; Docente departamento Salud Pública; Universidad Valparaíso.

